

Campo EM de Uma Carga Pontual

Conesamos com uma carga em repouso.


Sabemos que

→ carga

unidades
 $\epsilon_0 = 1$
 $c = 1$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r_0^2} \hat{r}_0$$

$$\vec{B} = \vec{0}$$



Podemos organizar os campos no tensor de Farada, $F_{\mu\nu}$

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$$

No nosso caso, temos

$$\vec{e}_{01} = \hat{x}_0$$

$$\vec{e}_{02} = \hat{y}_0$$

$$\vec{e}_{03} = \hat{z}_0$$

$$F_{0i} = -F_{i0} = -\frac{1}{4\pi} \frac{q}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}} \vec{e}_{0i}$$

outras componentes zeram.

$F_{\mu\nu}$ é um tensor: se transformamos sob boosts
de acordo com

$$F_{\mu\nu} \rightarrow \Lambda_{\mu}^{\rho} \Lambda_{\nu}^{\sigma} F_{\rho\sigma}$$

tensor de Faraday num novo
referencial

Vamos tomar Λ como um boost na direção \vec{x}^1
com velocidade v , i.e.,

$$\Lambda_{\mu}^{\rho} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$$

lembre que
estamos usando
 $c=1$, logo
 $\beta = \frac{v}{c} = v$

$$\Lambda_0^0 = \Lambda_1^1 = \gamma, \quad \Lambda_2^2 = \Lambda_3^3 = 1$$

$$\Lambda_0^1 = \Lambda_1^0 = -\gamma v$$

demais zeram

Vamos então calcular $F'_{\mu\nu} = \Lambda_{\mu}^{\rho} \Lambda_{\nu}^{\sigma} F_{\rho\sigma}$

Como $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$, $F'_{\mu\nu} = -F'_{\nu\mu}$. De fato,

$$\begin{aligned} F'_{\mu\nu} &= \Lambda_{\mu}^{\rho} \Lambda_{\nu}^{\sigma} F_{\rho\sigma} \\ &= -\Lambda_{\mu}^{\rho} \Lambda_{\nu}^{\sigma} F_{\sigma\rho} \\ &= -\Lambda_{\nu}^{\sigma} \Lambda_{\mu}^{\rho} F_{\sigma\rho} \\ &= -F'_{\nu\mu} \end{aligned}$$

Logo, a diagonal de $F'_{\mu\nu}$ se anula e vale que $F'_{0i} = -F'_{i0}$, $F'_{ij} = -F'_{ji}$ \rightarrow poderemos recuperar \vec{E}' e \vec{B}'

Calculamos F'_{0i} . Para $i \in \{1, 2, 3\}$ (componente x), temos

$$\begin{aligned} F'_{0i} &= \Lambda_0^{\rho} \Lambda_i^{\sigma} F_{\rho\sigma} \\ &= \Lambda_0^0 \Lambda_i^{\sigma} F_{0\sigma} + \Lambda_0^j \Lambda_i^{\sigma} F_{j\sigma} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \gamma \Lambda_i^{\sigma} F_{0\sigma} - \gamma v \Lambda_i^{\sigma} F_{j\sigma} \\ &= \gamma \Lambda_i^j F_{0j} - \gamma v \Lambda_i^0 F_{20} \end{aligned}$$

$F_{00} = 0$
 $\Lambda_2^2 = \Lambda_3^3 = 0$

$F_{ji} = 0$
 corresponde a $\vec{B} = \vec{0}$

$-E_i$

$$F'_{01} = (\gamma^2 - \gamma^2 v^2) F_{01}$$

$$= F_{01} \Rightarrow F'_{01} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & ? & ? \\ E_x & 0 & ? & ? \\ ? & ? & 0 & ? \\ ? & ? & ? & 0 \end{pmatrix}$$

A seguir, fazamos F'_{02} .

$$F'_{02} = \Lambda_0^\rho \Lambda_2^\sigma F_{\rho\sigma}$$

$$= \Lambda_0^0 \Lambda_2^0 F_{00} + \Lambda_0^1 \Lambda_2^0 F_{10}$$

$$= \gamma \Lambda_2^0 F_{00} - \gamma v \Lambda_2^0 F_{10}$$

$$= \gamma \Lambda_2^2 F_{02} - \gamma v \Lambda_2^2 F_{12}$$

$$= \gamma F_{02}$$

Analogamente, tem-se $F'_{03} = \gamma F_{03}$

$$\hookrightarrow F' = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -\gamma E_y & -\gamma E_z \\ E_x & 0 & ? & ? \\ \gamma E_y & ? & 0 & ? \\ \gamma E_z & ? & ? & 0 \end{pmatrix}$$

Resta calcularmos as componentes do campo magnético.

De forma genérica temos

$$\begin{aligned}
 F_{ij}^1 &= \Lambda_i^\rho \Lambda_j^\sigma F_{\rho\sigma} \\
 &= \Lambda_i^0 \Lambda_j^0 F_{00} + \Lambda_i^h \Lambda_j^\sigma F_{h\sigma} \\
 &= \Lambda_i^0 \Lambda_j^0 F_{00} + \Lambda_i^h \Lambda_j^0 F_{h0} \\
 &= \Lambda_i^0 \Lambda_j^h F_{0h} - \Lambda_j^0 \Lambda_i^h F_{0h} \\
 &= (\Lambda_i^0 \Lambda_j^h - \Lambda_j^0 \Lambda_i^h) F_{0h}
 \end{aligned}$$

$F_{00}=0$ (red arrow) $F_{hh}=0$ pois $\vec{B}=0$

$B_x (F_{23})$ $\Lambda_2^0=0$ $\Lambda_3^0=0$

$$\begin{aligned}
 F_{23}^1 &= (\cancel{\Lambda_2^0} \Lambda_3^h - \Lambda_3^0 \cancel{\Lambda_2^h}) F_{0h} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$B_y (F_{31})$ $\Lambda_3^0=0$

$$\begin{aligned}
 F_{31}^1 &= (\cancel{\Lambda_3^0} \Lambda_1^h - \Lambda_1^0 \cancel{\Lambda_3^h}) F_{0h} \\
 &= \gamma_v \Lambda_3^1 F_{0h}
 \end{aligned}$$

$$= \gamma_v \Lambda_3^3 F_{03} = \gamma_v F_{03} = -\gamma_v E_z$$

$B_z (F_{12})$

$$\Lambda_2^0 = 0$$

$$F'_{12} = (\Lambda_1^0 \Lambda_2^k - \Lambda_2^0 \Lambda_1^k) F_{0k}$$

$$= -\gamma v F_{02}$$


$$= \gamma v E_y$$

$$F' = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & \gamma E_y & \gamma E_z \\ E_x & 0 & \gamma v E_y & \gamma v E_z \\ \gamma E_y & -\gamma v E_y & 0 & 0 \\ \gamma E_z & -\gamma v E_z & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Assim, temos, por exemplo,

$$E'_y = \frac{1}{4\pi} \frac{\gamma q \gamma_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}^3} \hat{y}_0$$

↳ expresso nas coordenadas originais



Transformação das coordenadas:

$$x^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu x^\nu$$

$$\begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma t_0 - \gamma v x_0 \\ \gamma x_0 - \gamma v t_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

interferendo:

$$t_0 = \gamma t + \gamma v x = \gamma (t + vx)$$

$$x_0 = \gamma x + \gamma v t = \gamma (x + vt)$$

$$y_0 = y$$


$$z_0 = z$$

$$E'_x = \frac{1}{4\pi} \frac{q x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}$$


inalterado, pois $\vec{v} \parallel \vec{x}_0$

$$= \frac{1}{4\pi} \frac{\gamma q (x + vt)}{\sqrt{\gamma^2 (x + vt)^2 + y^2 + z^2}}$$

$\hat{x} = \hat{x}_0$



Definindo $\vec{R} = \vec{x}' + \vec{v}t = \begin{pmatrix} x - vt \\ y \\ z \end{pmatrix}$, que aponta da partícula ao ponto de medição, temos então

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{R^2 \cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta}} \hat{R} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(1 - v^2)}{\sqrt{1 - v^2 \sin^2 \theta}} \frac{\hat{R}}{R} \end{aligned}$$


Resta expressar o campo magnético.

Vimos que

$$E'_x = E_x$$

$$B'_x = 0$$

$$E'_y = \gamma E_y$$

$$B'_y = -\gamma v E_z$$

$$E'_z = \gamma E_z$$

$$B'_z = \gamma v E_y$$

$$\vec{B} = +\vec{v} \times \vec{E}$$

De fato,

$$\vec{v} \times \vec{E} = \begin{pmatrix} \hat{x}_0 & \hat{y}_0 & \hat{z}_0 \\ v & 0 & 0 \\ E_x & \gamma E_y & \beta E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\gamma v E_z \\ \gamma v E_y \end{pmatrix}$$

Assim,

$$\vec{B} = \frac{1}{4\pi} \frac{q(1-v^2)}{\sqrt{1-v^2 \sin^2 \theta}} \frac{\vec{v} \times \hat{R}}{R^2}$$

Ver também:

D. J. Griffiths (2017) An Introduction to Electrodynamics (CUP, Cambridge).